

Material Suplementario

Tablas

Tabla 1A. Análisis demográfico según profesión

Variable	Profesión					Total (%)	P (Pearson)
	Intensivista	No Intensivista	Kine/FT	Trc	Otro		
Región							
Norteamérica	1	0	1	1	0	3 (0,9)	< 0,01
Sudamérica	26	1	121	56	10	214 (61,9)	
Centroamérica	44	2	0	17	19	82 (23,7)	
Europa	26	2	0	0	3	31 (8,9)	
Asia	11	1	0	3	0	15 (4,3)	
África	1	0	0	0	0	1 (0,3)	
Años de experiencia							
< 5 años	27	2	46	24	12	111 (32,1)	< 0,05
5 a 10 años	29	2	43	13	9	96 (27,8)	
10 a 15 años	22	1	20	16	4	63 (18,2)	
> 15 años	31	1	13	24	7	76 (21,9)	
Criterios definir SDRA							
1 criterio	13	3	12	7	5	40 (11,6)	0,09
2 criterios	18	1	13	7	7	46 (13,3)	
3 criterios	42	0	42	18	9	111 (32,1)	
4 criterios	20	0	26	23	6	75 (21,7)	
5 criterios	14	2	16	15	5	52 (15)	
6 criterios	2	0	10	5	0	17 (4,9)	
7 criterios	0	0	2	2	0	4 (1,2)	
8 criterios	0	0	1	0	0	1 (0,3)	

Tabla 2A. Análisis de variables (preguntas) según profesión

Variable	Profesión					Total (%)	<i>P</i> (Pearson)
	Intensivista	No Intensivista	Kine/FT	Trc	Otro		
PaO ₂ mínima							
< 75 mmHg	1	0	1	2	0	4 (1,2)	< 0,05
75 a 80 mmHg	10	0	4	10	4	28 (8,1)	
81 a 85 mmHg	12	1	13	21	5	52 (15)	
86 a 90 mmHg	66	3	62	34	17	182 (52,6)	
91 a 95 mmHg	19	2	42	10	6	79 (22,8)	
> 96 mmHg	1	0	0	0	0	1 (0,3)	
Modo ventilatorio							
VC-CMV	71	3	106	34	19	233 (67,3)	< 0,01
PC-CMV	23	2	11	17	7	60 (17,3)	
“PRVC”	7	0	2	2	1	12 (3,5)	
PC-CSV	2	1	1	1	3	8 (2,3)	
SIMV	3	0	0	3	0	6 (1,7)	
NAVA	1	0	0	0	0	1 (0,3)	
PAV	0	0	0	1	1	2 (0,6)	
VAFO	0	0	1	1	0	2 (0,6)	
Otros	2	0	1	18	1	22 (6,4)	
Volumen Tidal							
< 6 ml/kg	47	4	59	30	8	148 (42,8)	0,14
6 a 8 ml/Kg	61	2	62	46	23	194 (56,1)	
8 a 10 ml/Kg	1	0	1	1	0	3 (0,9)	
> 10 ml/kg	0	0	0	0	1	1 (0,3)	
DP adecuada en SDRA							
8 a 12 cmH ₂ O	24	0	25	15	5	69 (21,7)	0,67

13 a 15 cmH ₂ O	72	4	87	47	16	226 (71,1)	
16 a 18 cmH ₂ O	6	1	5	6	4	22 (6,9)	
> 18 cmH ₂ O	0	0	1	0	0	1 (0,3)	
Pplat objetivo en SDRA							
25 a 30 cmH ₂ O	97	4	113	68	23	305 (88,2)	< 0,05
30 a 35 cmH ₂ O	12	2	8	7	9	38 (11)	
> 35 cmH ₂ O	0	0	1	2	0	3 (0,9)	
Mide a. pulmonar en SDRA							
Por hipotensión	19	0	13	9	4	45 (13)	
Rutinario	2	1	1	6	1	11 (3,2)	
Por Paw elevadas	0	0	1	3	3	7 (2)	
En hipoxemia refractaria	7	0	5	7	2	21 (6,1)	< 0,01
Rara vez	48	2	32	15	8	105 (30,4)	
Nunca	33	3	70	37	14	157 (45,4)	
Nivel máximo MP							
15 J/min	21	2	18	21	4	66 (32,4)	
16 J/min	4	0	4	7	1	16 (7,8)	
17 J/min	19	2	24	6	1	52 (25,5)	
18 J/min	7	0	4	3	0	14 (6,9)	0,23
18 a 20 J/min	5	0	6	3	3	17 (8,3)	
No influye	11	0	16	8	4	39 (19,1)	

Figuras




Figura 1A. Análisis de proporción de profesionales según los años de experiencia




Figura 2A. Probabilidad de elección de la PaO₂ mínima, según el tipo de profesional




Figura 3A. Comparación de los modos ventilatorios más prevalentes según profesionales para SDRA moderado a severo




Figura 4A. Probabilidad de elección de la Pplat, según el tipo de profesional